

Baza pytań do Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Psychiatria

Pytanie nr 1

Bulimia **najbardziej** współwystępuje z:

- A. depresją.
- B. osobowością anankastyczną.
- C. osobowością chwiejną emocjonalnie typu *borderline*.
- D. uzależnieniami.
- E. zaburzeniami lękowymi.

Pytanie nr 2

Epizod depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej częściej niż w przebiegu zaburzeń depresyjnych nawracających charakteryzuje się:

- A. nadmierną sennością.
- B. młodym wiekiem wystąpienia pierwszego epizodu.
- C. obecnością objawów psychotycznych.
- D. opornością na leczenie za pomocą leków przeciwdepresyjnych.
- E. wszystkimi wymienionymi.

Pytanie nr 3

Psychoterapia może w różnym stopniu współuczestniczyć w leczeniu farmakologicznym następujących schorzeń:

- A. zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, psychoz.
- B. depresji, psychoz.

- C. zaburzeń lękowych, psychoz.
- D. zaburzeń osobowości, psychoz.
- E. zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości.

Pytanie nr 4

Sedacja, wzrost masy ciała, hipotonia to najistotniejsze objawy uboczne:

- A. olanzapiny.
- B. rysperydonu.
- C. kwetiapiny.
- D. amisulprydu.
- E. aripirazolu.

Pytanie nr 5

Który z wymienionych leków **nie jest** stosowany w leczeniu przedwczesnego wytrysku?

- A. klomipramina.
- B. sertralina.
- C. fluoksetyna.
- D. dapoksetyna.
- E. wszystkie powyższe są stosowane.

Pytanie nr 6

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zespołów otępiennych:

- A. memantyna jest zarejestrowana do leczenia otępienia w chorobie Alzheimera o lekkim i umiarkowanym nasileniu.
- B. ze względu na nadwrażliwość na inhibitory cholinesterazy w otępieniu z ciałami Lewy'ego zaleca się stosowanie memantyny.
- C. w otępieniu czołowo-skroniowym, w przeciwieństwie do choroby Alzheimera, typowe

jest występowanie objawów neurologicznych.

D. w otępieniu z ciałami Lewy'ego maksymalny odstęp czasowy między wystąpieniem parkinsonizmu i objawów otępienia wynosi 6 miesięcy.

E. haloperidol jest lekiem I rzutu w leczeniu otępienia z ciałami Lewy'ego z obecnymi halucynacjami wzrokowymi.

Pytanie nr 7

Najkrótszy spodziewany okres przeżycia od rozpoznania dotyczy pacjentów cierpiących na:

A. otępienie w chorobie Alzheimera.

B. otępienie naczyniowe.

C. otępienie z ciałami Lewy'ego.

D. otępienie czołowo-skroniowe.

E. otępienie w chorobie Parkinsona.

Pytanie nr 8

Kryterium czasowe rozpoznania insomnii to utrzymywanie się objawów powyżej:

A. jednego tygodnia.

B. dwóch tygodni.

C. jednego miesiąca.

D. sześciu miesięcy.

E. jednego roku.

Pytanie nr 9

Mężczyzna lat 23 relacjonuje, że od kilkunastu tygodni „słyszy w głowie głos, który komentuje to, co mężczyzna robi i każe mu popełnić samobójstwo.” Objaw ten jest najbardziej charakterystyczny dla zespołu:

A. depresyjnego.

B. paranoidalnego.

C. paranoicznego.

D. uzależnienia od alkoholu.

E. katatonicznego.

Pytanie nr 10

Do głównych objawów depresji atypowej należą:

A. nadmierna senność, utrata apetytu.

B. reaktywność nastroju, wzmożone łaknienie.

C. dobowe wahania nastroju, spadek masy ciała.

D. wzmożone łaknienie, niepokój psychoruchowy.

E. gorsze samopoczucie wieczorem, skrócenie snu.

Pytanie nr 11

Zespół ratownictwa medycznego został wezwany do pacjentki lat 16 z powodu zasłabnięcia. W badaniu stwierdzono: tętno 45/min., RR 90/50 mmHg, w Ekg - komorowe zaburzenia rytmu, Na⁺ 135 mmol/l, K⁺ 3 mmol/l; wzrost 165 cm, waga 35 kg. Zespół ratownictwa powinien:

A. przetransportować pacjentkę do oddziału psychiatrycznego.

B. przetransportować pacjentkę do oddziału pediatrycznego.

C. przetransportować pacjentkę do szpitalnego oddziału ratunkowego.

D. pozostawić pacjentkę w domu i zalecić wizytę u lekarza POZ.

E. pozostawić pacjentkę w domu i zalecić wizytę u lekarza w PZP.

Pytanie nr 12

Zespół ratownictwa medycznego został wezwany do pacjentki lat 71 z powodu zasłabnięcia. W badaniu stwierdzono: tętno 85/min., HR 100/60 mmHg, w Ekg - w normie, sód: 130 mmol/l, potas: 3 mmol/l, wzrost 165 cm, waga 65 kg. Zaburzona orientacja

allopsychiczna, prawidłowa autopsychiczna, halucynuje słuchowo, podatna na sugestię.

Zespół ratownictwa powinien:

- A. przetransportować pacjentkę do oddziału psychiatrycznego.
- B. przetransportować pacjentkę do oddziału internistycznego.
- C. przetransportować pacjentkę do szpitalnego oddziału ratunkowego.
- D. pozostawić pacjentkę w domu i zalecić wizytę u lekarza POZ.
- E. pozostawić pacjentkę w domu i zalecić wizytę u lekarza w PZP.

Pytanie nr 13

Osobowość to:

- A. zespół względnie trwałych cech, dyspozycji, właściwości człowieka nadających względną spójność jego zachowaniu.
- B. przypisywanie sobie lub innym osobom wyolbrzymionych cech lub właściwości negatywnych.
- C. zespół genów decydujących o zachowaniu i właściwościach człowieka.
- D. zdolność do myślenia abstrakcyjnego.
- E. zdolność do myślenia krytycznego w stosunku do dorosłych, jak i siebie samego.

Pytanie nr 14

Jedynym zaburzeniem preferencji seksualnych (parafilią), które występuje równie często u kobiet, jak i u mężczyzn jest:

- A. fetyszyzm.
- B. masochizm.
- C. sadyzm.
- D. ekshibicjonizm.
- E. oglądactwo.

Pytanie nr 15

U kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną należy wziąć pod uwagę jej interakcje z lekami normotymicznymi. Jako leki bezpieczne, nieobniżające osoczowego stężenia hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych, zarekomendować można:

- 1) lit;
- 2) walproinian;
- 3) karbamazepinę;
- 4) leki przeciwpsychotyczne II generacji;
- 5) lamotryginę.

Prawidłowa odpowiedź to:

- A.** 1,3,4.
- B.** 2,4,5.
- C.** 1,2,4,5.
- D.** 1,3,4,5.
- E.** 2,3,4,5.

Pytanie nr 16

U pacjentki lat 25, chorującej na schizofrenię, po zastosowanej farmakoterapii doszło do akatyzji. Pacjentka najprawdopodobniej przyjmuje:

- A.** olanzapinę.
- B.** kwetiapinę.
- C.** klozapol.
- D.** amisulpryd.
- E.** aripiprazol.

Pytanie nr 17

Bóle mięśni, dysforia, pobudzenie psychoruchowe, łzawienie, zwiększona potliwość, „gęsia skórka”, to niektóre z objawów abstynencyjnych występujące po odstawieniu:

- A.** kanabinoli.
- B.** benzodiazepin.

C. kokainy.

D. alkoholu.

E. heroiny.

Pytanie nr 18

Hebefilia jest podtypem:

A. fetysyzmu.

B. ekshibicjonizmu.

C. pedofilii.

D. sadomasochizmu.

E. transwestytyzmu.

Pytanie nr 19

Lekiem wykazującym istotne działanie zapobiegające występowaniu tendencji samobójczych jest/są:

A. olanzapina.

B. kwetiapina.

C. walproinian.

D. lamotrygina.

E. sole litu.

Pytanie nr 20

W skład tzw. triady depresyjnej Becka wchodzi następujące przekonania pacjenta:

- 1) nic mi się w życiu nie udało;
- 2) świat jest zagrażający;
- 3) jestem zbyt wrażliwy;
- 4) mam ciągle kłopoty z pamięcią;
- 5) nic dobrego mnie już nie spotka.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3,4.

B. 1,3,4.

C. 2,3,4.

D. 1,2,5.

E. 3,4,5.

Pytanie nr 21

Jednym z objawów, które często towarzyszą depresji i znacząco pogarszają jej przebieg jest uporczywy ból. Zastosowanie których z poniższych leków przeciwdepresyjnych należy rozważyć w opisanej sytuacji klinicznej?

1) duloksetyny;

2) trazodonu;

3) agomelatyny;

4) wenlafaksyny;

5) milnacipranu.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 2.

B. tylko 4.

C. 3,5.

D. 1,2,4.

E. 1,4,5.

Pytanie nr 22

Nyktofobia to lęk przed:

A. ciemnością.

B. myszami, szczurami.

C. wężami.

D. brudem.

E. zmianami.

Pytanie nr 23

Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach karnych związane jest z:

- 1) orzekaniem o zasadności przyjęcia do szpitala;
- 2) orzekaniem o niepoczytalności;
- 3) orzekaniem o stopniu ograniczenia poczytalności;
- 4) orzekaniem o świadomości wyrażenia woli;
- 5) orzekaniem o swobodzie wyrażenia woli;
- 6) orzekaniem o stanie psychicznym *tempore criminis*.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,2,6.

C. 2,3,5.

D. 4,5,6.

E. 2,3,6.

Pytanie nr 24

Wskaż najbardziej charakterystyczne dla zespołu paranoidalnego zaburzenia treści myślenia:

A. odsłonięcia myśli.

B. trucia.

C. zazdrości.

D. hipochondryczne.

E. ksobne.

Pytanie nr 25

Wskaż co **nie jest** formą środka zabezpieczającego, orzecanego przez sąd, dla osoby chorej psychicznie, która dopuściła się czynu zabronionego:

- A. elektroniczna kontrola miejsca pobytu.
- B. leczenie ambulatoryjne we wskazanej placówce.
- C. stała opieka rodziny nad chorym.
- D. pobyt w zakładzie psychiatrycznym.
- E. terapia uzależnionego.

Pytanie nr 26

Faza snu, w trakcie której obserwuje się zniesienie napięcia mięśni poprzecznie prążkowanych oraz występują marzenia senne to faza/stadium:

- A. czuwania.
- B. REM.
- C. NREM, stadium N1.
- D. NREM, stadium N2.
- E. NREM, stadium N3.

Pytanie nr 27

49-letnia kobieta przyszła do apteki i prosi o wydanie bez recepty opakowania leku, który pomoże jej usnąć w nocy i ukoić nadwyrężone „trudną sytuacją rodzinną” nerwy. Obiecuje doniesienie recepty w ciągu kilku dni, gdy tylko jej lekarz wróci z wakacji oraz zaprzecza by nadużywała leków nasennych lub uspokajających. Na odmowę kobieta reaguje wzburzeniem, płaczem i coraz intensywniejszym domaganiem się leku, prosząc o wydanie „choć kilku tabletek Relanium”. Najprawdopodobniej kobieta ta cierpi na:

- A. zaburzenia lękowe uogólnione.
- B. nieorganiczne zaburzenie snu.
- C. zespół uzależnienia od środków o działaniu nasennym i uspokajającym.
- D. epizod depresji umiarkowany.
- E. chorobę afektywną dwubiegunową.

Pytanie nr 28

Mimowolne ruchy w zakresie kończyn, mięśni mimicznych, nie występujące w czasie snu, nasilające się pod wpływem emocji, będące objawem ubocznym działania leków przeciwpsychotycznych to:

- A. akatyzia.
- B. dyskinezy.
- C. dystonie.
- D. parestezje.
- E. bradykineza.

Pytanie nr 29

Do objawów somatycznych anoreksji należy:

- A. brak miesiączki.
- B. meszek na ciele.
- C. osteoporoza.
- D. bradykardia.
- E. każdy z wymienionych.

Pytanie nr 30

Agitacja to:

- A. typ wolno płynącego, uogólnionego lęku.
- B. świadome wyolbrzymianie obecnych objawów.
- C. świadome relacjonowanie objawów, które w rzeczywistości nie występują.
- D. nadmierna aktywność ruchowa połączona z uczuciem wewnętrznego napięcia.
- E. nagły zryw w przebiegu osłupienia katatonicznego.

Pytanie nr 31

Do zaburzeń preferencji seksualnych **nie należy**:

- A. pedofilia.
- B. sadomasochizm.
- C. transwestytyzm fetyszystyczny.
- D. transwestytyzm o typie podwójnej roli.
- E. ekshibicjonizm.

Pytanie nr **32**

Głównym objawem w halucynozie alkoholowej są:

- A. urojenia zazdrości.
- B. halucynacje wzrokowe.
- C. omamy słuchowe.
- D. pseudohalucynacje słuchowe.
- E. urojenia prześladowcze.

Pytanie nr **33**

W psychiatrii termin „mania” oznacza:

- A. synonim podejrzliwości, nieufności, „teorii spiskowych” („mania prześladowcza”).
- B. myśli wielkościowe („mania wielkościowa”).
- C. synonim choroby psychicznej, obłądu.
- D. zespół objawów psychopatologicznych, charakteryzujących się m.in. wzmożonym napędem i nastrojem, występujący m.in. w przebiegu zaburzeń afektywnych.
- E. synonim kompulsywnych zachowań (np. „mania mycia rąk”).

Pytanie nr **34**

Obszar mózgu odpowiedzialny za konsolidację pamięci to:

- A. kora przedczołowa.
- B. hipokamp.
- C. międzymózgowie.
- D. ciało migdałowate.
- E. zwoje podstawy.

Pytanie nr 35

Kryterium czasowe rozpoznania dystymii u dzieci wynosi:

- A. 2 lata.
- B. 1 rok.
- C. 6 miesięcy.
- D. 1 miesiąc.
- E. 2 tygodnie.

Pytanie nr 36

Cechy ojca są dominującym czynnikiem ryzyka wystąpienia osobowości:

- A. histrionicznej.
- B. paranoicznej.
- C. chwiejnej emocjonalnie.
- D. dyssocjalnej.
- E. schizoidalnej.

Pytanie nr 37

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące pseudomnezji:

- 1) są to inaczej wspomnienia rzekome;
- 2) obejmują konfabulacje;
- 3) obejmują omamy pamięciowe;

4) są to inaczej złudzenia pamięciowe utożsamiające;

5) są to inaczej allomnezje;

6) obejmują kryptomnezje.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,2,6.

C. 2,3,4.

D. 2,3,5.

E. 1,3,6.

Pytanie nr 38

Do najczęstszych objawów ubocznych leków z grupy SSRI należą:

A. zaburzenia poznawcze.

B. objawy stenokardialne.

C. zawroty głowy.

D. nudności, biegunki, bezsenność.

E. myśli samobójcze.

Pytanie nr 39

Do jakościowych zaburzeń aktywności ruchowej **nie należą**:

A. katalepsja.

B. katapleksja.

C. echopraksja.

D. automatyzm nakazowy.

E. posturyzmy.

Pytanie nr 40

U pacjentki lat 25, chorującej na schizofrenię, po zastosowanej farmakoterapii doszło do zatrzymania miesiączki. Pacjentka najprawdopodobniej przyjmuje:

- A. olanzapinę.
- B. kwetiapinę.
- C. zyprazydon.
- D. rysperydon.
- E. aripiprazol.

Pytanie nr 41

Potrzeba noszenia ubrań płci przeciwnej, głównie po to, aby osiągnąć podniecenie seksualne i mieć wygląd osoby płci przeciwnej, nosi nazwę:

- A. fetysyzmu.
- B. skoptofilii.
- C. transwestytyzmu fetyszystycznego.
- D. froteryzmu.
- E. transseksualizmu.

Pytanie nr 42

Wskaż **falszywe** stwierdzenie:

- A. pacjent wypowiadający konfabulacje jest podatny na sugestie.
- B. wysycenie emocjonalne u pacjenta wypowiadającego konfabulacje jest atymiczne, paratymiczne lub katatymiczne.
- C. treść konfabulacji jest niezmienna.
- D. wysycenie emocjonalne u pacjenta wypowiadającego omamy pamięci jest syntymiczne.
- E. konfabulacje i omamy pamięci należą do pseudomnezji.

Pytanie nr 43

Parasomnie **nie obejmują**:

- A. somnambulizmu.
- B. koszmarów sennych.
- C. nocnego bruksizmu.
- D. narkolepsji.
- E. lęków nocnych.

Pytanie nr 44

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, do szpitala psychiatrycznego można przyjąć bez zgody osobę:

- 1) która jest chora psychicznie i nie stosuje systematycznie leków;
- 2) która jest chora psychicznie i zagraża bezpośrednio swojemu życiu;
- 3) która jest chora psychicznie i stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób;
- 4) która stanowi zagrożenie dla porządku prawnego;
- 5) u której podejrzewa się chorobę psychiczną celem obserwacji.

Prawidłowa odpowiedź to:

- A. 1,2.
- B. 2,3.
- C. 1,3,4.
- D. 2,3,4.
- E. 1,2,3,5.

Pytanie nr 45

Leczenie nasilonych objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego polega na:

- 1) nawadnianiu pacjenta;
- 2) uzupełnianiu niedoborów elektrolitowych i witaminowych;
- 3) stosowaniu leków z grupy benzodiazepin;
- 4) stosowaniu leków z grupy SSRI.

Prawidłowa odpowiedź to:

- A. 1,2.

B. 1,2,3.

C. wszystkie wymienione.

D. 3,4.

E. tylko 1.

Pytanie nr 46

Dysfunkcjonalne zachowanie, euforia, wrażenie większej energii, nadmierna czujność, wyższościowe przekonania, kłótlivość, agresywność, powtarzane, stereotypowe zachowania, iluzje słuchowe, wzrokowe, nastawienie urojeniowe. Ponadto występowanie przynajmniej jednego z następujących objawów: zaburzenia rytmu serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, potliwość, dreszcze, nudności, wymioty, rozszerzone źrenice, osłabienie siły mięśniowej. Powyższy opis odpowiada:

A. schizofrenii w fazie zaostrzenia.

B. zaburzeniom afektywnym dwubiegunowym, epizod maniakalny.

C. zaburzeniom afektywnym dwubiegunowym, epizod mieszany.

D. przedawkowaniu psychostymulantów (amfetaminy).

E. zespołowi abstynencyjnemu poalkoholowemu.

Pytanie nr 47

Do leczenia epizodu depresyjnego w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych powinno się zastosować w pierwszej kolejności:

A. fluoksetynę.

B. haloperidol.

C. doksepinę.

D. kwas walproinowy.

E. lamotryginę.

Pytanie nr 48

Objawy negatywne w schizofrenii obejmują:

- A. urojenia nihilistyczne.
- B. omamy.
- C. zubożenie wypowiedzi.
- D. pseudohalucynacje.
- E. formalne zaburzenia myślenia.

Pytanie nr 49

Przyjmowanie niezwykłych, dziwacznych, często niewygodnych pozycji ciała, np. w wygięciu, skłonie to:

- A. manieryzmy ruchowe.
- B. echopraksja.
- C. katapleksja.
- D. stereotypie ruchowe.
- E. posturyzmy.

Pytanie nr 50

Pacjent odczuwa lęk podczas występów publicznych - obawia się przede wszystkim oceny ze strony innych ludzi. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

- A. fobia społeczna.
- B. lęk paniczny.
- C. lęk uogólniony.
- D. agorafobia.
- E. lęk paniczny z agorafobią.

Pytanie nr 51

67-letnia kobieta mieszka samotnie w niewielkim mieszkaniu w bloku. Od około 2 lat

wchodzi w konflikty ze swoimi sąsiadami. Pacjentka wygraża sąsiadom, stuka w rury oraz w sufit. Uważa, że sąsiedzi wpuszczają do jej mieszkania trujący gaz. Często wzywa policję z prośbą o interwencję. Skarży się na sąsiadów, na nieudolność policji, wygraża pracownikom administracji osiedla. Kobieta nigdy wcześniej nie leczyła się psychiatrycznie. Wskaż najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

- A.** schizofrenia.
- B.** zaburzenia schizotypowe.
- C.** uporczywe zaburzenia urojeniowe.
- D.** ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.
- E.** zaburzenia schizoafektywne.

Pytanie nr 52

Mantyzm to:

- A.** całkowite zatrzymanie wątku myślowego, który dotychczas przebiegał w sposób spowolniony.
- B.** brak reakcji słownej, mimo poleceń i zachęt skierowanych do chorego.
- C.** poczucie uciążliwego nadmiaru spontanicznie pojawiających się kolejnych wątków i tematów myślenia, zwykle zakłócających je i wyrażających się w ograniczeniu płynności, jasności, zawartości wypowiedzi.
- D.** uporczywe powtarzanie tej samej czynności.
- E.** powtarzanie słów, zgłosek, nietworzących sensownej całości, a połączonych jedynie podobieństwem brzmienia.

Pytanie nr 53

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące ADHD:

- 1) typowo rozpoznaje się do 3. r.ż.;
- 2) częściej występuje u chłopców;
- 3) charakteryzuje się deficytem uwagi, nadruchliwością, impulsywnością;
- 4) charakteryzuje się zaburzeniami komunikacji, interakcji społecznych, zachowania i zabawy;
- 5) czynniki genetyczne odgrywają znaczącą rolę;
- 6) niepełnosprawność intelektualna dotyczy 65-88% procent osób dotkniętych ADHD;

7) towarzyszą zaburzenia rozwoju mowy.

Prawidłowa odpowiedź to:

- A. 1,3,5.
- B. 1,2,4,7.
- C. 2,3,6.
- D. 1,4,5,7.
- E. 2,3,5.

Pytanie nr **54**

Najczęstszym objawem niepożądanym związanym ze stosowaniem klozapiny jest/są:

- A. zespół metaboliczny.
- B. zespół parkinsonowski.
- C. zaburzenia rytmu serca.
- D. leukopenia.
- E. hiperprolaktynemia.

Pytanie nr **55**

Katalepsja jest przykładem:

- A. ilościowych zaburzeń aktywności ruchowej.
- B. jakościowych zaburzeń aktywności ruchowej.
- C. ilościowych zaburzeń pamięci.
- D. jakościowych zaburzeń pamięci.
- E. jakościowych zaburzeń świadomości.

Pytanie nr **56**

Wskaż **falszywe** stwierdzenie dotyczące problematyki samobójstw:

- A.** mężczyźni rzadziej niż kobiety dokonują skutecznych samobójstw.
- B.** kobiety częściej niż mężczyźni podejmują próby samobójcze stosując leki.
- C.** alkohol znacznie podnosi ryzyko samobójstwa.
- D.** zaburzenia depresyjne i zaburzenia osobowości są najczęstszą diagnozą psychiatryczną u młodzieży po próbie samobójczej.
- E.** niski poziom wykształcenia jest jednym z czynników społeczno-demograficznych zachowań samobójczych.

Pytanie nr **57**

Postępowaniem objawowym z wyboru w przypadku wystąpienia zespołu lęku napadowego jest podanie:

- A.** diazepamu dożylnie.
- B.** haloperidolu domięśniowo.
- C.** alprazolamu krótko działającego doustnie.
- D.** wenlafaksyny doustnie.
- E.** paroksetyny doustnie.

Pytanie nr **58**

Pacjent, lat 58, trafił do szpitala psychiatrycznego po interwencji policji. Żona pacjenta wezwała policję, ponieważ mąż był agresywny wobec niej oraz ich sąsiada. Pacjent jest bardzo zazdrosny o swoją żonę. Śledzi ją, nie pozwala jej spotykać się ze znajomymi, kontroluje. Groził sąsiadowi, a nawet swojemu bratu, twierdząc, że są kochankami żony. Pacjent nadużywa alkoholu od 25 lat. Najbardziej prawdopodobną diagnozą jest zespół:

- A.** Fregoliego.
- B.** Capgrasa.
- C.** Cotarda.
- D.** Otella.
- E.** Gansera.

Pytanie nr 59

Do podstawowych leków stosowanych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej należą:

- 1) lamotrygina;
- 2) karbamazepina;
- 3) topiramát;
- 4) sulpiryd;
- 5) lit.

Prawidłowa odpowiedź to:

- A. 1,2,3.
- B. 1,2,5.
- C. 2,3.
- D. 3,4.
- E. 4,5.

Pytanie nr 60

Które z wymienionych połączeń leków jest najbardziej niebezpieczne?

- A. escitalopram z kwetiapiłą.
- B. lamotrygina z sertralina.
- C. bupropion z citalopramem.
- D. moklobemid z klomipramina.
- E. agomelatyna z wenlafaksyna.

Pytanie nr 61

Które z zaburzeń okresu okołoporodowego najczęściej nie wymaga podejmowania leczenia?

- A. depresja poporodowa.
- B. depresja w okresie ciąży.

C. „baby blues”.

D. OCD.

E. uogólnione zaburzenia lękowe.

Pytanie nr **62**

Do leków stosowanych doraźnie w napadzie paniki należy:

A. fluoksetyna.

B. wenlafaksyna.

C. alprazolam.

D. aripiprazol.

E. klorazepat.

Pytanie nr **63**

Spośród zaburzeń psychicznych u młodzieży największa śmiertelność występuje w przypadku:

A. szkodliwego używania alkoholu.

B. zaburzeń lękowych.

C. zaburzeń osobowości.

D. jadłowstrętu psychicznego.

E. schizofrenii.

Pytanie nr **64**

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące złośliwego zespołu neuroleptycznego:

A. wiąże się z nasileniem przekąźnictwa dopaminergicznego.

B. występuje z częstością 0,02-3% osób leczonych neuroleptykami.

C. częściej występuje u kobiet.

D. przejawia się hipotermią.

E. jest następstwem niewydolności nerek.

Pytanie nr 65

Sytuację, w której dotychczas sprawnie przebiegający wątek wypowiedzi ulega nagłemu zatrzymaniu, nazywa się:

A. zahamowaniem myślenia.

B. otamowaniem myślenia.

C. rozkojarzeniem.

D. sałatą słowną.

E. inkoherencją myślenia.

Pytanie nr 66

Do grupy dyssomnii **nie należy**:

A. narkolepsja.

B. zespół niespokojnych nóg.

C. hipersomnia.

D. somnambulizm.

E. pierwotna bezsenność.

Pytanie nr 67

Jakościowe zaburzenia pamięci, polegające na odtwarzaniu z zasobów pamięci informacji, które postrzegane są jako terazniejsze, nowe to:

A. złudzenia pamięciowe.

B. kryptomnezje.

C. dysmnezje.

D. omamy pamięciowe.

E. pseudomnezje.

Pytanie nr 68

Obserwacja stanu psychicznego pacjenta przyjętego do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego może trwać:

A. maksymalnie 10 dni.

B. minimalnie 10 dni.

C. maksymalnie 14 dni.

D. minimalnie 14 dni.

E. do momentu ustąpienia przesłanek ustawowych, gdyż art. 24 ustawy nie ogranicza zakresu czasowego obserwacji.

Pytanie nr 69

Do objawów majaczenia drzennego **nie należy/nie należą**:

A. objaw białej kartki.

B. omamy cenestetyczne.

C. urojenia dziania się.

D. bradykardia.

E. podwyższone ciśnienie tętnicze.

Pytanie nr 70

Dla otępienia z ciałkami Lewy'ego charakterystyczne są:

1) omdlenia;

2) nadwrażliwość na neuroleptyki;

3) objawy zespołu parkinsonowskiego ;

4) urojenia trucizny;

5) halucynacje wzrokowe.

Prawidłowa odpowiedź to:

- A. 1,2,5.
- B. 1,2,3,5.
- C. wszystkie wymienione.
- D. 1,2,3.
- E. 4,5.

Pytanie nr 71

Objaw charakterystyczny dla majaczenia alkoholowego, w którym u chorego wywołuje się omamy wzrokowe poprzez delikatny ucisk gałek ocznych, nazywany jest objawem:

- A. Bella.
- B. Reichardta.
- C. Aschaffenburga.
- D. Liepmanna.
- E. Cullena.

Pytanie nr 72

Katalepsja jest objawem należącym do grupy zaburzeń:

- A. nastroju.
- B. kontroli impulsów.
- C. aktywności ruchowej.
- D. świadomości.
- E. woli i aktywności złożonej.

Pytanie nr 73

Do selektywnych inhibitorów wychwyty zwrotnego serotoniny **nie należy**:

- A. sertralina.

- B.** fluoksetyna.
- C.** fluwoksamina.
- D.** wortioksetyna.
- E.** paroksetyna.

Pytanie nr 74

U 27-letniego mężczyzny postawiono rozpoznanie schizofrenii paranoidalnej. Badania laboratoryjne wykazały następujące odchylenia od normy: glikemia na czczo 110 mg/dl, cholesterol całkowity 245 mg/dl, trójglicerydy 223 mg/dl. Obwód w pasie 110 cm, BMI - 29 kg/m². Biorąc pod uwagę powyższe dane, który z wymienionych leków przeciwpsychotycznych byłby najlepszym wyborem dla chorego?

- A.** aripiprazol.
- B.** klozapina.
- C.** kwetiapina.
- D.** olanzapina.
- E.** rysperydon.

Pytanie nr 75

Strukturą pierwotną umysłu, która utożsamiana jest z popędowością, generującą silne potrzeby i emocje, która dąży do natychmiastowego zaspokojenia dającego poczucie gratyfikacji jest:

- A.** id.
- B.** superego.
- C.** świadomość.
- D.** przedświadomość.
- E.** ego.

Pytanie nr 76

Do objawów zespołu serotoninowego **nie należy**:

- A. hipertermia.
- B. zmniejszone napięcie mięśniowe.
- C. splątanie.
- D. występowanie nudności i wymiotów.
- E. nadmierne pocenie się.

Pytanie nr 77

Do allomnezji należą:

- 1) iluzje pamięci;
- 2) kryptomnezje;
- 3) omamy pamięci;
- 4) złudy utożsamiające;
- 5) ekmnezje.

Prawidłowa odpowiedź to:

- A. 1,2,4.
- B. 1,3,4.
- C. 2,3,4.
- D. 1,2,5.
- E. 3,4,5.

Pytanie nr 78

Wskaż kryteria diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego:

- A. spadek wagi lub, u dzieci, brak przybytku wagi prowadzący do masy ciała o co najmniej 5% poniżej prawidłowej lub oczekiwanej stosownie do wieku i wzrostu, wraz z towarzyszącymi objawami depresyjnymi.
- B. spadek wagi lub, u dzieci, brak przybytku wagi prowadzący do masy ciała o co najmniej 10% poniżej prawidłowej lub oczekiwanej stosownie do wieku i wzrostu, wraz z towarzyszącymi objawami depresyjnymi.

C. spadek wagi lub, u dzieci, brak przybytku wagi prowadzący do masy ciała o co najmniej 10% poniżej prawidłowej lub oczekiwanej stosownie do wieku i wzrostu. Nie muszą być obecne zaburzenia nastroju.

D. spadek wagi lub, u dzieci, brak przybytku wagi prowadzący do masy ciała o co najmniej 15% poniżej prawidłowej lub oczekiwanej stosownie do wieku i wzrostu, wraz z towarzyszącymi objawami depresyjnymi.

E. spadek wagi lub, u dzieci, brak przybytku wagi prowadzący do masy ciała o co najmniej 15% poniżej prawidłowej lub oczekiwanej stosownie do wieku i wzrostu. Nie muszą być obecne zaburzenia nastroju.

Pytanie nr 79

Kryterium czasowe rozpoznania zaburzeń lękowych uogólnionych wynosi:

A. 2 tygodnie.

B. 1 miesiąc.

C. 3 miesiące.

D. 6 miesięcy.

E. 1 rok.

Pytanie nr 80

Do objawów charakterystycznych dla zespołu majaczenia **nie należy**:

A. zaburzenie cyklu sen-czuwanie.

B. podwyższona aktywność psychoruchowa.

C. anhedonia.

D. upośledzenie pamięci świeżej.

E. nieprawidłowa orientacja allopsychiczna.

Pytanie nr 81

Zastosowanie przymusu bezpośredniego reguluje:

- A. kodeks cywilny.
- B. kodeks karny.
- C. ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
- D. konwencja o ochronie praw człowieka.
- E. rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Pytanie nr **82**

Który stan chorobowy może być przyczyną majaczenia u pacjenta w podeszłym wieku?

- A. zapalenie płuc.
- B. zapalenie układu moczowego.
- C. niewydolność nerek.
- D. żaden z wymienionych.
- E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr **83**

Hipowitaminoza B₁ jest często obserwowana w przebiegu:

- A. zespołu Korsakowa.
- B. otępienia czołowo-skroniowego.
- C. zespołu majaczeniowego.
- D. zespołu depresyjnego.
- E. ostrych przemijających zaburzeń psychiatrycznych.

Pytanie nr **84**

W czasie leczenia preparatami litu:

- A. monitorowania wymaga funkcja tarczycy i nerek.
- B. monitorowania wymaga funkcja przytarczyc.

- C. należy regularnie wykonywać EKG.
- D. monitorowania wymaga poziom trójglicerydów.
- E. należy regularnie oznaczać morfologię z rozmazem.

Pytanie nr 85

Duże ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego, wymagające monitorowania pacjenta w tym kierunku, związane jest ze stosowaniem w terapii:

- A. sertraliny.
- B. paroksetyny.
- C. risperidonu.
- D. olanzapiny.
- E. mianseryny.

Pytanie nr 86

Do czynników wpływających na rozwój *anorexia nervosa* **nie należą**:

- A. czynniki genetyczne.
- B. czynniki osobowościowe.
- C. swoiste relacje rodzinne.
- D. choroby somatyczne.
- E. czynniki kulturowe.

Pytanie nr 87

U 30-letniego chorego z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej zalecono jeden z leków zapobiegających nawrotom choroby. Po kilku dniach zażywania leku wystąpiły poliuria oraz drżenie kończyn górnych. Objawy te sugerują, że najprawdopodobniej zastosowano:

- A. karbamazepinę.

B. kwas walproinowy.

C. lamotryginę.

D. okskarbamazepinę.

E. sole litu.

Pytanie nr 88

35-letnia kobieta od kilku lat leczy się u lekarza rodzinnego z powodu licznych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (wzdęcia, nudności, czasami ból), częstego oddawania moczu, okresowego uczucia duszności, które nie jest związane z wysiłkiem. Dolegliwości te występują w różnych konstelacjach i nasileniu, prawie przez cały czas i nie mają związku z wydarzeniami życiowymi. Nie podejrzewa u siebie żadnej konkretnej choroby, ale funkcjonuje coraz gorzej. Pacjentka była konsultowana przez gastroenterologa i kardiologa, którzy po wykonaniu niezbędnych badań nie stwierdzili choroby. Stosowała różne leki p-bólowe, rozkurczowe oraz środki dostępne w aptekach bez recepty, ale nie zaobserwowała poprawy. Opisane dolegliwości odpowiadają kryteriom diagnostycznym:

A. zaburzeń hipochondrycznych.

B. zaburzeń somatyzacyjnych.

C. bólu psychogennego.

D. neurastenii.

E. mieszanych zaburzeń konwersyjnych.

Pytanie nr 89

Przykładem zespołu paranoicznego jest zespół:

A. Capgrasa.

B. Otella.

C. Cotarda.

D. Korsakowa.

E. Gansera.

Pytanie nr 90

Wskaż **falszywe** stwierdzenie dotyczące omamów hipnagogicznych:

- A. często dotyczą sytuacji z minionego dnia.
- B. mogą przejść w marzenia senne.
- C. pojawiają się podczas zasypiania.
- D. są stanem fizjologicznym.
- E. są wyłącznie wyobrażeniami wzrokowymi.

Pytanie nr 91

Do preparatów o udowodnionej skuteczności w terapii otępienia w przebiegu choroby Alzheimera należą:

- 1) rywastygmina;
- 2) alfosceran choliny;
- 3) piracetam;
- 4) donepezyl;
- 5) memantyna.

Prawidłowa odpowiedź to:

- A. 1,2,4.
- B. 1,4,5.
- C. 2,3,4.
- D. 1,2,5.
- E. 3,4,5.

Pytanie nr 92

Do zaburzeń treści myślenia występujących w przebiegu zespołu maniakalnego zalicza się:

- A. gonitwę myśli.
- B. natłok myśli.

- C. urojenia nihilistyczne.
- D. urojenia wielkościowe.
- E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,D.

Pytanie nr **93**

Mutyzm należy do zaburzeń:

- A. treści myślenia.
- B. spostrzegania.
- C. pamięci.
- D. toku myślenia.
- E. emocji.

Pytanie nr **94**

Podstawą terapii u osób z zaburzeniami osobowości jest:

- A. psychoterapia.
- B. regularne stosowanie leków z grupy SSRI.
- C. regularne stosowanie leków z grupy SNRI.
- D. hospitalizacja w oddziale zamkniętym.
- E. żadna z powyższych.

Pytanie nr **95**

Sugestywność, płytko chwiejna uczuciowość, teatralność i przesadny wyraz emocjonalny, skoncentrowanie na atrakcyjności fizycznej to cechy charakterystyczne dla osobowości:

- A. dyssocjalnej.
- B. paranoicznej.
- C. borderline.

D. histrionicznej.

E. anankastycznej.

Pytanie nr 96

Które z wymienionych objawów, poza obniżonym nastrojem, należą do podstawowych objawów zespołu depresyjnego?

- 1) zaburzenia koncentracji uwagi;
- 2) zmniejszenie energii lub zwiększona męczliwość;
- 3) anhedonia lub utrata zainteresowań;
- 4) zaburzenia snu i łaknienia;
- 5) lęk;
- 6) nieuzasadnione poczucie winy;
- 7) myśli rezygnacyjne lub samobójcze.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. 3,4.

C. 5,7.

D. 2,3.

E. 4,6.

Pytanie nr 97

Organiczny, niespecyficzny zespół mózgowy, zazwyczaj o ostrym początku, przebiegający z zaburzeniami przytomności, głównie wahaniami świadomości, a także zaburzeniami innych czynności psychologicznych jak uwaga, spostrzeganie, myślenie, pamięć, funkcje psychomotoryczne, rytmy dobowe. Powyższy opis odpowiada objawom zespołu:

A. otępiennego.

B. depresyjnego.

C. majaczeniowego.

D. paranoidalnego.

E. maniakalnego.

Pytanie nr 98

Podczas badania psychiatrycznego 25-letniego mężczyzny skierowanego po nadużyciu leków i alkoholu, ustalono, że jego dotychczasowe zachowanie charakteryzuje się występowaniem: niestabilności emocjonalnej, uczucia wewnętrznej pustki, skłonności do zachowań autodestrukcyjnych oraz niestabilnymi związkami emocjonalnymi. Takie cechy najbardziej odpowiadają kryteriom diagnostycznym zaburzeń osobowości:

- A. *borderline* (z pogranicza).
- B. dyssocjalnych.
- C. histrionicznych.
- D. narcystycznych.
- E. typu osobowości zależnej.

Pytanie nr 99

Do zaburzeń treści myślenia należą:

- 1) urojenia niezgodne z nastrojem;
- 2) urojenia zgodne z nastrojem;
- 3) idee nadwartościowe;
- 4) myślenie magiczne;
- 5) mutyzm.

Prawidłowa odpowiedź to:

- A. 1,2,3,4.
- B. 1,3,4.
- C. 2,3,4.
- D. 1,2,3.
- E. 3,4,5.

Pytanie nr 100

Lekiem stosowanym w terapii choroby Alzheimera jest:

- A. sertralina.

B. sulpiryd.

C. donepezil.

D. piracetam.

E. lorazepam.

Pytanie nr 101

Do lekarza rodzinnego zgłosiła się 33-letnia chora, która leczy się u psychiatry z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej. Od 2 miesięcy zażywa olanzapinę 10 mg na dobę. Nie chorowała na inne choroby przewlekłe. Powodem wizyty jest przyrost wagi o 5 kg (waga: 82 kg, wzrost: 175 cm, BMI: 26,8 kg/m²). Jaki minimalny zestaw badań laboratoryjnych jest zalecany w celu monitorowania leczenia olanzapiną?

1) TSH, fT3, fT4;

2) kreatynina;

3) glikemia;

4) bilirubina;

5) elektrolity;

6) kinaza fosfokreatynowa;

7) lipidogram.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,5.

B. 2,5.

C. 2,6.

D. 3,7.

E. 4,6.

Pytanie nr 102

Epizod depresyjny można rozpoznać, jeśli objawy utrzymują się co najmniej:

A. 1 tydzień.

B. 2 tygodnie.

C. 1 miesiąc.

D. 2 miesiące.

E. 6 miesięcy.

Pytanie nr 103

Do kryteriów epizodu maniakalnego **nie należy**:

A. myślenie katastroficzne.

B. gonitwa myśli.

C. zmniejszona potrzeba snu.

D. postawa wielkościowa.

E. rozpraszalność uwagi.

Pytanie nr 104

Do objawów charakterystycznych schizofrenii **nie należy/a**:

A. echo myśli.

B. urojenia oddziaływania.

C. halucynoidy.

D. pseudohalucynacje.

E. rozkojarzenie.

Pytanie nr 105

Zmiany patologiczne w korze skroniowej i ciemieniowej oraz w układzie limbicznym, zmienne nasilenie zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzenia spostrzegania, parkinsonizm, upadki, omdlenia, zespół depresyjny, nadwrażliwość na neuroleptyki. Powyższy opis odpowiada otępieniu:

A. czołowo-skroniowemu.

B. z ciałami Lewy'ego.

C. w chorobie Parkinsona.

D. naczyniopochodnemu.

E. w chorobie Alzheimera.

Pytanie nr **106**

Którego leku **nie stosuje** się w epizodzie maniakalnym?

A. karbamazepiny.

B. arypiprazolu.

C. lamotryginy.

D. olanzapiny.

E. wenlafaksyny.

Pytanie nr **107**

Lekiem normotymicznym **nie jest**:

A. lit.

B. olanzapina.

C. karbamazepina.

D. lamotrygina.

E. haloperidol.

Pytanie nr **108**

Który z wymienionych leków należy do inhibitorów cholinesterazy?

A. kwetiapina.

B. memantyna.

C. doksepina.

D. rywastygmina.

E. karbamazepina.

Pytanie nr **109**

Wskazaniem do terapii elektrowstrząsami jest:

- A. epizod depresji ciężki lekooporny.
- B. schizofrenia u kobiet ciężarnych.
- C. osobowość dyssocjalna.
- D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
- E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

Pytanie nr **110**

Lekiem stosowanym do szybkiego, krótkoterminowego, doraźnego opanowywania zaburzeń lękowych jest:

- A. wenlafaksyna.
- B. sertralina.
- C. alprazolam.
- D. kwetiapina.
- E. lamotrygina.

Pytanie nr **111**

Specyficzna fobia, w której dochodzi do mobilizacji układu przywspółczulnego, to:

- A. ergofobia.
- B. erytrofobia.
- C. homichlofobia.
- D. koitofobia.
- E. hemofobia.

Pytanie nr **112**

Do objawów pozytywnych schizofrenii należy/a:

- A. abulia.
- B. wycofanie społeczne.
- C. zubożenie wypowiedzi.
- D. apatia.
- E. zachowania katatoniczne.

Pytanie nr 113

Pacjentka lat 56, zgłosiła się do psychiatry z powodu apatii, anhedonii, myśli rezygnacyjnych, obniżonego apetytu, utrzymujących się od około 2 miesięcy. Pacjentka dotychczas nieleczona psychiatrycznie, jest pod opieką internisty z powodu nadciśnienia tętniczego. Psychiatra postawił wstępne rozpoznanie epizodu depresyjnego umiarkowanego. Który lek powinien zalecić pacjentce?

- A. alprazolam - małe dawki 3 razy dziennie regularnie, ewentualnie w przypadku podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego dodatkowa dawka.
- B. olanzapina - małe dawki, w początkowej fazie leczenia poprawi apetyt.
- C. escitalopram - lek z grupy SSRI, stosowany w leczeniu depresji.
- D. wenlafaksyna - lek z grupy SNRI, stosowany w leczeniu depresji.
- E. leczenie skojarzone A i D.

Pytanie nr 114

MMSE (*Mini Mental State Examination*) i TRZ (test rysowania zegara) to rekomendowane testy przesiewowe w kierunku:

- A. niepełnosprawności umysłowej.
- B. zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych.
- C. zaburzeń osobowości.
- D. autyzmu.

E. otępienia.

Pytanie nr 115

Życzeniowe przekształcanie przeżyć, zachowań, oczekiwań na przyszłość pod wpływem nastawień emocjonalnych, które zwykle nie są odzwierciedleniem rzeczywistości to:

A. syntymia.

B. katatymia.

C. hipotymia.

D. atymia.

E. hipertymia.

Pytanie nr 116

Kryterium czasowe rozpoznania cyklotymii u osób dorosłych wynosi:

A. 2 lata.

B. 1 rok.

C. 6 miesięcy.

D. 1 miesiąc.

E. 2 tygodnie.

Pytanie nr 117

Wskaż **falszywe** stwierdzenie dotyczące złośliwego zespołu neuroleptycznego:

A. występuje dwa razy częściej u mężczyzn niż u kobiet.

B. charakteryzuje się wzrostem stężenia fosfokinazy kreatynowej powyżej 1000 j./litr, przy jednoczesnym zmniejszeniu aktywności transaminaz.

C. powikłaniem zespołu mogą być zaburzenia rytmu serca, łącznie z nagłym zatrzymaniem krążenia.

D. do obrazu klinicznego zespołu należą wzmocnienie napięcia mięśniowego i zaburzenia świadomości.

E. w badaniach laboratoryjnych można stwierdzić mioglobinurię.

Pytanie nr 118

Osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody, w celu wyjaśnienia tych wątpliwości. W takiej sytuacji obserwacja stanu psychicznego pacjenta może trwać:

- A. maksymalnie 10 dni.
- B. minimalnie 10 dni.
- C. maksymalnie 14 dni.
- D. minimalnie 14 dni.
- E. dowolny czas, o ile jest to uzasadnione wątpliwościami diagnostycznymi.

Pytanie nr 119

Nagła utrata napięcia mięśniowego, doprowadzająca do upadku, bez utraty przytomności to:

- A. katatonia.
- B. katapleksja.
- C. katalepsja.
- D. katatymia.
- E. konwersja.

Pytanie nr 120

Lekiem, którego **nie stosuje** się w leczeniu objawów psychotycznych w przebiegu schizofrenii jest:

- A. aripiprazol.
- B. haloperidol.

C. olanzapina.

D. rysperydon.

E. trazodon.

Pytanie nr 121

Przykładem zaburzeń treści myślenia syntymicznych z zespołem depresyjnym są urojenia:

A. nihilistyczne.

B. prześladowcze.

C. zazdrości.

D. oddziaływania.

E. posłannicze.

Pytanie nr 122

Wskaż dostępne leki, zarejestrowane w Polsce w leczeniu ADHD u dzieci:

A. atomoksetyna, paroksetyna, olanzapina.

B. bupropion, metylfenidat, karbamazepina.

C. atomoksetyna, s-ketamina, rysperydon.

D. atomoksetyna, metylfenidat.

E. żadne z powyższych - jedyną skuteczną metodą leczenia jest psychoterapia.

Pytanie nr 123

Rodzaj zaburzeń spostrzegania, wobec których chorzy zachowują krytycyzm to:

A. halucynacje.

B. pseudohalucynacje.

C. parahalucynacje.

D. omamy rzekome.

E. omamy cenestetyczne.

Pytanie nr 124

Przykładem leku o działaniu serotoninerpicznym i noradrenergicznym (SNRI) jest:

A. fluoksetyna.

B. reboksetyna.

C. kwetiapina.

D. trazodon.

E. wenlafaksyna.

Pytanie nr 125

Tendencja do izolowania się, wycofanie emocjonalne, zdystansowanie, brak potrzeby wchodzenia w bliskie relacje z innymi ludźmi, brak lub znikoma liczba działań służących przyjemności, to cechy:

A. osobowości schizoidalnej.

B. osobowości paranoicznej.

C. zaburzeń schizotypowych.

D. osobowości unikającej.

E. osobowości dyssocjalnej.

Pytanie nr 126

Do leków normotymicznych, stosowanych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej, **nie należy**:

A. kwas walproinowy.

B. karbamazepina.

C. kwetiapina.

D. olanzapina.

E. rywastygmina.

Pytanie nr 127

Do leków stosowanych w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera należą:

- 1) mianseryna;
- 2) mirtazapina;
- 3) memantyna;
- 4) rywastygmina;
- 5) duloksetyna.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3.

B. 1,4,5.

C. 3,4.

D. 4,5.

E. wszystkie wymienione.

Pytanie nr 128

Wzorzec zachowań zdominowany oderwaniem od relacji międzyludzkich i ograniczonym wyrażaniem emocji w kontaktach interpersonalnych. Powyższy opis odnosi się do zaburzeń osobowości:

A. paranoicznej.

B. schizoidalnej.

C. dyssocjalnej.

D. borderline.

E. anankastycznej.

Pytanie nr 129

Wskaż minimalne kryterium czasowe utrzymywania się objawów konieczne dla rozpoznania wymienionego zaburzenia psychicznego:

- A. 4 tygodnie dla epizodu depresji.
- B. 7 dni dla zespołu maniakalnego.
- C. 2 miesiące dla zaburzeń lękowych uogólnionych.
- D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
- E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

Pytanie nr **130**

Do testów przesiewowych przydatnych w diagnostyce zaburzeń poznawczych należy:

- A. skala Becka.
- B. skala MADRS.
- C. MMPI.
- D. MMSE.
- E. skala HAMA-A.

Pytanie nr **131**

Objawy negatywne schizofrenii obejmują:

- A. urojenia nihilistyczne.
- B. omamy.
- C. sztywność emocjonalną.
- D. prawdziwe są odpowiedzi A, C.
- E. formalne zaburzenia myślenia.

Pytanie nr **132**

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące iluzji:

- A. są synonimem omamów rzekomych.
- B. należą do zaburzeń spostrzegania.

C. sąd realizujący i klasyfikujący jest prawidłowy.

D. prawdziwe są odpowiedzi B,C.

E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

Pytanie nr 133

Do objawów osiowych schizofrenii opisanych przez Bleuler'a **nie należy**:

A. ambiwalencja.

B. urojenia odsłonięcia.

C. autyzm.

D. sztywność emocjonalna.

E. rozkojarzenie myślenia.

Pytanie nr 134

Pacjent zgłaszający się do lekarza z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej typu II może znajdować się w każdym z wymienionych stanów, **z wyjątkiem**:

A. hipomanii.

B. głębokiej depresji.

C. subdepresji.

D. manii psychotycznej.

E. eutymii.

Pytanie nr 135

Usystematyzowany, wewnętrznie spójny i logiczny system urojeniowy to:

A. zespół paranoidalny.

B. zespół paranoiczny.

C. zespół Gansera.

D. zespół Ekboma.

E. żaden z powyższych.

Pytanie nr 137

Aby rozpoznać chorobę afektywną dwubiegunową (CHAD) typu II potrzebne jest wystąpienie co najmniej dwóch epizodów zaburzeń nastroju, w tym co najmniej jednego epizodu hipomanii, która trwa co najmniej:

A. 4 dni.

B. 7 dni.

C. 14 dni.

D. 28 dni.

E. 2 miesiące.

Pytanie nr 138

W przypadku leczenia chorych na schizofrenię klozapiną niezbędne jest monitorowanie:

A. stężenia kreatyniny.

B. stężenia hormonów tarczycy.

C. elektrolitów (Na i K).

D. gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP).

E. morfologii i rozmazu.

Pytanie nr 139

Według FDA, z największym ryzykiem teratogennym w trakcie ciąży wiąże się stosowanie:

A. sertraliny.

B. paroksetyny.

C. mianseryny.

D. trazodonu.

E. escitalopramu.

Pytanie nr 140

Lekiem, który można podawać w iniekcjach długo działających w schizofrenii jest:

A. chlorprotiksen.

B. tiapryd.

C. haloperidol.

D. klozapina.

E. amisulpryd.

Pytanie nr 141

Stan zafałszowania pamięci polegający na zachowaniu w pamięci zdarzeń z przeszłości i przeżywaniu ich jako aktualnych zdarzeń nazywany jest:

A. iluzją pamięci.

B. kryptomnezją.

C. konfabulacją.

D. ekmnezją.

E. wspomnieniem ejdetycznym.

Pytanie nr 142

Największe ryzyko pojawienia się zespołu metabolicznego u pacjentów ze schizofrenią występuje u osób przyjmujących:

A. olanzapinę.

B. aripiprazol.

C. zyprazydon.

D. lurazydon.

E. karyprazyne.

Pytanie nr 143

28-letni pacjent zgłasza się do lekarza psychiatry i podaje, że od okresu liceum w jego zachowaniu dominują: nadmierne wåtpliwość i ostrożność, perfekcjonizm przeszkadzający w wypełnianiu zadań, nadmierna pedanteria i uległość wobec konwencji społecznych, sztywność i upór. Pacjent najprawdopodobniej ma dominujące cechy osobowości:

A. lękliwej.

B. zależnej.

C. histrionicznej.

D. anankastycznej.

E. chwiejnej emocjonalnie.

Pytanie nr 144

Najczęściej stosowanym lekiem w leczeniu bulimii psychicznej z towarzyszącymi objawami depresji jest:

A. olanzapina.

B. mirtazapina.

C. fluoksetyna.

D. klozapina.

E. diazepam.

Pytanie nr 145

Do powikłań somatycznych jadłowstrętu psychicznego **nie zalicza** się:

A. osteoporozy.

B. hiperkaliemii.

C. bradykardii.

D. niedokrwistości.

E. zaburzeń miesiączkowania.

Pytanie nr 146

U pacjenta z depresją i padaczką **nie należy** stosować:

A. tianeptyny.

B. bupropionu.

C. moklobemidu.

D. mirtazapiny.

E. trazodonu.

Pytanie nr 147

Ryzyko zachorowania na schizofrenię u monozygotycznego bliźniaka pacjenta ze schizofrenią wynosi:

A. 20%.

B. 30%.

C. 50%.

D. 70%.

E. 80%.

Pytanie nr 148

Najczęstszy przebieg schizofrenii to:

A. pojedynczy epizod psychotyczny z pełnym powrotem do zdrowia.

B. przebieg chroniczny z szybką deterioracją funkcjonalną.

C. przebieg prosty, ze stopniowym narastaniem objawów.

D. przebieg falujący, z okresami zaostrzeń choroby i remisji.

E. kilka epizodów psychotycznych w ciągu życia, pojawiających się w sytuacjach stresowych.

Pytanie nr 149

Do objawów pozytywnych schizofrenii należą:

- 1) halucynacje;
- 2) obniżony nastrój;
- 3) anhedonia;
- 4) ambiwalencja;
- 5) urojenia.

Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2.

B. wszystkie wymienione.

C. 1,5.

D. 2,5.

E. 3,4.

Pytanie nr 150

Wskaż prawdziwe kryterium czasowe występowania epizodu depresyjnego wg klasyfikacji ICD-10:

A. 2 tygodnie.

B. 1 miesiąc.

C. 3 miesiące.

D. 6 miesięcy.

E. żadne z wymienionych.

Pytanie nr 151

Wśród zaburzeń psychicznych największe ryzyko śmiertelności wiąże się z:

A. epizodem depresyjnym.

- B. schizofrenią.
- C. chorobą afektywną dwubiegunową.
- D. anoreksją.
- E. otępieniem w chorobie Alzheimera.

Pytanie nr **152**

Lekiem, którego stosowanie wiąże się z najniższym ryzykiem metabolicznym jest:

- A. kwetiapina.
- B. olanzapina.
- C. haloperidol.
- D. sulpiryd.
- E. aripiprazol.

Pytanie nr **153**

Do grupy leków inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI **nie należy**:

- A. paroksetyna.
- B. wortioksetyna.
- C. sertralina.
- D. fluwoksamina.
- E. escitalopram.